**ENQUÊTE NATIONALE
SUR LA MALADIE DE CROHN**

FICHE DE RECUEIL DES DONNÉES

Fiche N° :

Sexe : H F

Age = ans

Catégorie d'âge :

1. A1 : 16 – 40 ans
2. A2 : 41 – 60 ans
3. A3 : > 60 ans

Date d'intervention (jj/mm/aaaa) :

..... / /

Date de sortie (jj/mm/aaaa) :

..... / /

Tabagisme actif :

Oui Non

Stress en milieu professionnel :

Oui Non

ATCD médicaux : (Choix multiple)

1. Maladie cœliaque
2. Thyroïdite
3. Diabète
4. Autres ATCD médicaux :

.....
.....
.....
.....

Durée de la maladie : (Maladie de Crohn connue et suivie depuis) mois

ATCD chirurgicaux :

Opéré pour maladie de Crohn :

Oui Non

Gestes réalisés :

.....
.....
.....
.....

Appendicectomie :

Oui Non

Autres ATCD chirurgicaux :

.....
.....
.....
.....

ATCD Familiaux :

Maladie de Crohn :

Oui Non

Maladie cœliaque :

Oui Non

Siège des lésions : (Choix multiple)

1. Localisation digestive haute (OGD)
2. Localisation jéjunale
3. Localisation iléale
4. Localisation colique
5. Localisation grélo-colique
6. Localisation rectale
7. Localisation périnéale

Phénotype de la MC :

1. B1 : Inflammatoire (non sténosant, non pénétrant)
2. B2 : Sténosant
3. B3 : Pénétrant (Fistulisant)

Traitements pré-op :

Corticoïdes :

Oui Non

DCI :

Arrêté combien de jours avant l'intervention :

1. Moins de 7 jours
2. 7 – 14 jours
3. 15 – 21 jours
4. Plus de 21 jours

Aminosalicylés :

Oui Non

DCI :

Immunosuppresseurs :

Oui Non

DCI :

Arrêté combien de jours avant l'intervention :

1. Moins de 7 jours
2. 7 – 14 jours
3. 15 – 21 jours
4. Plus de 21 jours

Anti-TNF :

Oui Non

DCI :

Arrêté combien de jours avant l'intervention :

1. Moins de 7 jours
2. 7 – 14 jours
3. 15 – 21 jours
4. Plus de 21 jours

Immuno-nutrition avant l'intervention :

Oui Non

Contexte de la chirurgie : en urgence ?

Oui Non

Clinique pré opératoire :

Indice de performance OMS :

1. OMS 0
2. OMS 1
3. OMS 2
4. OMS 3
5. OMS 4

IMC : kg/m²

Fièvre : Oui Non

Inspection de l'abdomen : (Choix multiple)

1. Mini-laparotomie
2. Cicatrice médiane
3. Iléostomie
4. Colostomie
5. Abdomen vierge
6. Autres:

Syndrome sub-occlusif :

Oui Non

Nombre de selles liquides ou très molles par

Jour : / jour

Vomissements :

Oui Non

Douleurs abdominales :

1. Aucune
2. Légères
3. Moyennes
4. Intenses

Masse abdominale :

1. Absente
2. Douteuse
3. Certaine

Examen proctologique :

Fissure : Oui Non

Fistule : Oui Non

Séton : Oui Non

Signes extra-digestifs : (Choix multiple)

1. Aucun
2. Arthropathie
3. Uvéite/iritis
4. Stomatite aphteuse
5. Anomalies cutanées

CDAI ou Score de Best :

1. Non active < 150
2. Activité légère 150 - 220
3. Activité modérée 221 - 450
4. Activité sévère > 450

Biologie pré opératoire :

Hémoglobine : g/dl

Globules blancs (éléments/mm³) :

1. < 4000
2. 4000 - 10000
3. > 10000

CRP pré-op : mg/l

Vitamine D (ng/ml) :

1. Carence < 20
2. Insuffisance 20 - 30
3. Normale > 30
4. Non précisée

Ferritinémie (ng/ml) :

1. Normale
2. Basse
3. Non précisée

Albumine : g/l

Protidémie : g/l

Créatininémie :

1. Normale : 5 - 13
2. Élevée : > 13

Indications chirurgicales : (Choix multiple)

1. Sténose
2. Fistule
3. Abscess
4. Échec au traitement médical
5. Réintervention pour une récurrence post opératoire de la MC
6. MC Périnéale

Préparation préopératoire :

Transfusion :

1. 01 culot globulaire
2. ≥ 2 culots globulaires
3. Non faite

Perfusion de Fer IV :

Oui Non

Perfusion d'albumine :

Oui Non

Antibiotiques :

Oui Non

Anticoagulants :

Oui Non

Alimentation parentérale :

Oui Non

Classification ASA :

- 1. I
- 2. II
- 3. III
- 4. IV
- 5. V

Intervention :

Voie d'abord :

- 1. Laparotomie
- 2. Mini-laparotomie
- 3. Laparoscopie

Gestes réalisés : (Choix multiple)

- 1. Résection grêlique
- 2. Résection iléo-caecale
- 3. Résection iléo-colique
- 4. Colectomie
- 5. Proctectomie
- 6. Résection recto-sigmoïdienne
- 7. Colo-proctectomie
- 8. AAP
- 9. Résection anastomotique
- 10. Stricturoplastie
- 11. GEA
- 12. Chirurgie périnéale (séton...)

Longueur du grêle restant (cm): cm

Longueur du grêle réséqué (cm):
cm

Aspect des tranches de section :

- 1. Saines
- 2. Épaisses
- 3. Non précisé

Rétablissement de continuité (anastomose):

(Choix multiple)

- 1. Anastomose grélo-grélique
- 2. Anastomose grélo-colique
- 3. Anastomose iléo-rectale
- 4. Anastomose iléo-anale
- 5. Anastomose colo-colique

6. Anastomose colo-rectale

7. Anastomose colo-anale

8. Non faite

Type d'anastomose : (Choix multiple)

- 1. TT 2. TL 3. LT
- 4. LL 5. Kono-S

Suture :

- 1. Manuelle 2. Mécanique

Stomie :

- 1. Iléostomie
- 2. Colostomie
- 3. Aucune

Drainage :

Oui Non

Transfusion sanguine per opératoire:

- 1. 01 CG
- 2. ≥ 2 CG
- 3. Non faite

Durée d'intervention (minutes) : min

Suites opératoires dans les 30 jours post op :

1. Complications post-opératoires :

Oui Non

2. Traitement post-opératoire :

Transfusion :

- 1. 01 culot globulaire
- 2. ≥ 2 culots globulaires
- 3. Non faite

Perfusion de Fer IV :

Oui Non

Perfusion d'albumine :

Oui Non

Antibiotiques :

Oui Non

Anticoagulants :

Oui Non

Corticoïdes :

Oui Non

3. Complications dans les 30 jours post op :

Complications médicales : (Choix multiple)

- 1. Pneumopathie
- 2. Infection urinaire
- 3. Autres infections
- 4. TVP
- 5. Autre :
- 6. Aucune

Complications chirurgicales :

(Choix multiple)

- 1. Fistule digestive
- 2. Abscess profond
- 3. Péritonite postopératoire
- 4. Sepsis de la paroi
- 5. Eviscération
- 6. Hémorragie abdominale
- 7. Hémorragie digestive
- 8. Occlusion postopératoire précoce
- 9. Autre :
- 10. Aucune

6. Grade IVb

7. Grade V

Étude anatomo-pathologique de la pièce opératoire :

- 1. MC confirmée
- 2. MC dégénérée
- 3. Colite non spécifique

Débit de la fistule digestive :

- 1. Bas débit (< 500cc)
- 2. Haut débit (> 500cc)

Tarissement de la fistule digestive à :

- 1. < 15 jours
- 2. 15 – 30 jours
- 3. 31 – 45 jours
- 4. > 45 jours
- 5. Non précisé

4. Réintervention chirurgicale pour complication post opératoire :

Oui Non

5. Décès :

Oui Non

Durée d'hospitalisation (jours) : jours

Score d'évaluation de la gravite de la complication principale post opératoire (score de Clavien et Dindo 2004) :

Préciser quelle est la complication principale

:
.....
.....

Date de survenue de la complication principale (jj/mm/aaaa) : / /

Grade de la complication principale:

- 1. Grade I
- 2. Grade II
- 3. Grade IIIa
- 4. Grade IIIb
- 5. Grade IVa

Annexes :

Annexe 1 : Classification de Clavien et Dindo des complications post opératoires :

Grade	Définition
0	Aucune complication
I	Minime, ne nécessitant aucun traitement médical, chirurgical, endoscopique ou radiologique. Les médicaments autorisés sont : antiémétiques, antalgiques, antipyrétiques, diurétiques, électrolytes. Les abcès de paroi traités au lit du patient sont inclus dans ce groupe de complication.
II	Nécessitant un traitement médical avec d'autres médicaments que ceux cités précédemment. Les transfusions et la nutrition parentérale sont incluses dans ce groupe.
III	Nécessitant une intervention chirurgicale, endoscopique ou radiologique
IIIa	Sans anesthésie générale
IIIb	Avec anesthésie générale
IV	Mise en jeu du pronostic vital
IVa	Défaillance d'un organe (incluant la dialyse)
IVb	Défaillance multi viscérale
V	Décès